

UWAGA!!

W DNIU BADANIA KOLONOSKOPOWEGO PACJENT MUSI POSIADAĆ UBEZPIECZENIE W NFZ.

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

w znieczuleniu ogólnym

Dobre przygotowanie jelita do kolonoskopii poprawia jakość badania oraz skraca jego czas, dlatego prosimy dostosować się do poniższych zaleceń ograniczając posiłki i odpowiedni stosując środki przeczyszczające.

Prawidłową reakcją na leki będą częste wypróżnienia, pod koniec treścią płynną.

	Dieta	Zastosowanie leków przeczyszczających
3 dni przed terminem badania	Nie spożywać: - warzyw i owoców pestkowanych - pestek (siemię lniane, mak itp.) - ciemnego pieczywa - napojów gazowanych Zalecane: Dieta półpłynna, ryż, makaron, chleb, gotowane mięso i ryby, napoje niegazowane, herbata, kawa.	Dni bez leku przeczyszczającego
1 dzień przed terminem badania	Lekkostrawne śniadanie: lekka herbata, kawa bez fusów, bułka lub kromka chleba z masłem, z serem, jajkiem na twardo, plastrem wędliny. Godz. 13-15 galaretka, kisiel, przecedzony bulion. Godz. 15-22 woda, herbata, sok, można ssać landrynki, miód.	Około godz. 16.00 Rozpuścić zawartość 2 saszetek w 2 litrach niegazowanej wody (1 saszetka na 1 litr wody) i wypić w tempie szklanka co 10-15 minut
		O godz. 20.00 Rozpuścić zawartość 2 saszetek w 2 litrach niegazowanej wody (1 saszetka na 1 litr wody) i wypić w tempie szklanka co 10-15 minut
W dniu badania	UWAGA: BADANIE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM Przed badaniem: nie należy niczego przyjmować doustnie (nie wolno pić, jeść ssać cukierków, żuć gumy, połykać leków, palić tytoniu).	Dzień bez leku przeczyszczającego.

*Można poprawić smak roztworu Fortransu lekko schładzając płyn lub wkraplając sok z cytryny lub grejpfruta *

Czas działania leku Fortransu 6-8 godzin. Osoby regularnie zażywające leki przyjmują je zgodnie z zaleceniami lekarza, najlepiej 2 godziny przed lub po spożyciu preparatu przeczyszczającego.

Na badanie należy zgłosić się do: **Centrum Onkologii (Budynek główny)**

Zakład Endoskopii (parter- wejście z głównego holu , pok. 114)

Ul. I. Romanowskiej 2 Bydgoszcz 85-796

Tel. 52- 374 39 20

UWAGA!

JEŻELI JESTEŚ HONOROWYM DAWCĄ KRWI PAMIĘTAJ- 6 MIESIĘCY PO WYKONANEJ KOLONOSKOPII NIE MOŻNA ODDAWAĆ KRWI

Skonsultuj się ze swoim lekarzem przed badaniem jeżeli zażywasz leki:

- **Sintrom, Acenokumarol, Warfin**
- **Plavix, Colpidogrel, Areplex, Trombex, Zylt, Plavocorin, lub inny zawierający kłopidogrel**
- **Xarelto, Elizuis, inny**
- **Pradaxa**
- **Inne leki zmniejszające krzepliwość krwi, których nie można odstawić samodzielnie.**

1. Badania przedzabiegowe należy wykonać nie wcześniej niż 14 dni przed badaniem w **POLIKLINICE CENTRUM** (lub innej placówce):

- **Krew** (na CZCZO) (morfologia, sód, potas, kreatynina, glukoza, wskaźnik protrombiny + INR, APTT)
 - w godz. 6:15 – 10:00
 - gab. 29 lub 30
- **EKG** (*może być bez opisu*)
 - w godz. 8:00 – 15:00
 - gab. 131

2. W dniu badania kolonoskopowego wymagana jest dorosła osoba towarzysząca.

3. Nie malować paznokci – wykluczone tipsy itp.

Tel. 52 374 39 20

(budynek D, I piętro, pokój 125)

www.profilaktyka-jelita.pl

CZY WYSTĄPIŁY TAKIE CHOROBY JAK:

- **ZAWAŁ**
- **WYLEW**
- **CUKRZYCA**
- **PADACZKA**
- **GUZ MÓZGU**
- **ZAAWANSOWANA ASTMA**
- **Inne choroby utrudniające bezpieczne wykonanie znieczulenia ogólnego**